Klucz i wskazówki dla nauczyciela

Logarytm pierwiastka

Karty są odrębnymi propozycjami pracy. Poziomy konkursowe oznaczają autorską ocenę trudności, nie cytaty z konkretnego konkursu.

Zadanie źródłowe / rozwiązanie

Liczba pod pierwiastkiem to 5^2. Pierwiastek daje potęgę $5^{\frac{2}{3}}$. Z definicji logarytmu $\log_5 5^{\frac{2}{3}} = \frac{2}{3}$. Odpowiedź: B.

Odpowiedź: B

1 / Od schematu do wyzwania

1. Oblicz $\log_5 125 - \log_5 5$.

Odpowiedź: 2

Wartości logarytmów to 3 i 1.

2. Oblicz $\log_{25} \sqrt{5}$.

Odpowiedź: $\frac{1}{4}$

Podstawę zapisujemy z wykładnikiem 2, argument z wykładnikiem 1/2. Iloraz wykładników to 1/4.

3. Rozwiąż $\log_5(x-4) = 2$.

Odpowiedź: 29

Dziedzina: $x > 4$. Równanie daje $x - 4 = 25$, zatem $x = 29$; warunek jest spełniony.

4. Rozwiąż $\log_5 x + \log_5(x-4) = 1$.

Odpowiedź: 5

Dziedzina: $x > 4$. Iloczyn argumentów wynosi 5, więc $x^2 - 4x - 5 = 0$, czyli $(x-5)(x+1) = 0$. Tylko $x = 5$ należy do dziedziny.

5. Dla $a, b, c > 0$, różnych od 1, wykaż $\log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c a = 1$.

Odpowiedź: 1

Zapisz $u = \log_a b$, $v = \log_b c$, $w = \log_c a$. Wtedy $b = a^u$, $c = b^v = a^{uv}$ oraz $a = c^w = a^{uvw}$. Ponieważ a≠1, mamy uvw=1.

6. Znajdź wszystkie całkowite pary $2 \le u, v \le 25$, dla których $\log_u v + \log_v u = \frac{5}{2}$. Uzasadnij.

Odpowiedź: $\{(2,4), (3,9), (4,16), (5,25), (4,2), (9,3), (16,4), (25,5)\}$

Niech $t = \log_u v > 0$. Wtedy $\log_v u = 1/t$. Równanie $t + 1/t = 5/2$ daje $2t^2 - 5t + 2 = 0$, więc $t = 2$ lub $t = 1/2$. Oznacza to $v = u^2$ albo $u = v^2$. Mniejsza liczba może być dowolną całkowitą od 2 do 5; większa jest jej kwadratem. To wszystkie pary podane w odpowiedzi.

2 / Małe kroki

1. Oblicz $\log_5 25$.

Odpowiedź: 2

$5^2 = 25$.

2. Oblicz $\log_5 1$.

Odpowiedź: 0

Każda dodatnia podstawa różna od 1 do potęgi 0 daje 1.

Zadanie 3 jest oryginałem CKE; odpowiedź i rozwiązanie znajdują się na początku klucza.

3 / Rozgrzewka / 4 grupy

Każdy numer: 1 punkt; przy kilku odpowiedziach punkt za komplet poprawnych odpowiedzi. Czas: 5 minut.

Grupa A

1. Oblicz $\log_5 5$.

Odpowiedź: 1

Podstawa do potęgi 1 jest równa sobie.

2. Oblicz $\log_5 25$.

Odpowiedź: 2

$5^2 = 25$.

3. Oblicz $\log_5 1$.

Odpowiedź: 0

Argument 1 odpowiada wykładnikowi 0.

4. Oblicz $\log_5(1/5)$.

Odpowiedź: -1

$5^{-1} = 1/5$.

Grupa B

1. Oblicz $\log_6 6$.

Odpowiedź: 1

Podstawa do potęgi 1 jest równa sobie.

2. Oblicz $\log_6 36$.

Odpowiedź: 2

$6^2 = 36$.

3. Oblicz $\log_6 1$.

Odpowiedź: 0

Argument 1 odpowiada wykładnikowi 0.

4. Oblicz $\log_6(1/6)$.

Odpowiedź: -1

$6^{-1} = 1/6$.

Grupa C

1. Oblicz $\log_7 7$.

Odpowiedź: 1

Podstawa do potęgi 1 jest równa sobie.

2. Oblicz $\log_7 49$.

Odpowiedź: 2

$7^2 = 49$.

3. Oblicz $\log_7 1$.

Odpowiedź: 0

Argument 1 odpowiada wykładnikowi 0.

4. Oblicz $\log_7(1/7)$.

Odpowiedź: -1

$7^{-1} = 1/7$.

Grupa D

1. Oblicz $\log_8 8$.

Odpowiedź: 1

Podstawa do potęgi 1 jest równa sobie.

2. Oblicz $\log_8 64$.

Odpowiedź: 2

$8^2 = 64$.

3. Oblicz $\log_8 1$.

Odpowiedź: 0

Argument 1 odpowiada wykładnikowi 0.

4. Oblicz $\log_8(1/8)$.

Odpowiedź: -1

$8^{-1} = 1/8$.

4 / Znajdź błąd / 2 grupy

Po 1 punkcie za wskazanie błędu i 1 za poprawę z uzasadnieniem: 6 punktów na grupę.

Grupa A

1. Obliczano $\log_5 1$.

Odpowiedź: 0

Logarytm jest wykładnikiem. Jedynka powstaje przy wykładniku 0.

2. Upraszczano $\log_5 x + \log_5 y$ dla x,y>0.

Odpowiedź: $\log_5(xy)$

Suma logarytmów jest logarytmem iloczynu argumentów.

3. Rozwiązywano $\log_5 x = 2$.

Odpowiedź: $x = 25$

Z definicji logarytmu x jest kwadratem podstawy, nie jej podwojeniem.

Grupa B

1. Obliczano $\log_6 1$.

Odpowiedź: 0

Logarytm jest wykładnikiem. Jedynka powstaje przy wykładniku 0.

2. Upraszczano $\log_6 x + \log_6 y$ dla x,y>0.

Odpowiedź: $\log_6(xy)$

Suma logarytmów jest logarytmem iloczynu argumentów.

3. Rozwiązywano $\log_6 x = 2$.

Odpowiedź: $x = 36$

Z definicji logarytmu x jest kwadratem podstawy, nie jej podwojeniem.

5 / Matematyka w świecie

1. Skala mapy cyfrowej ma poziom $L = \log_2 z$. Dla powiększenia $z = 2^6$ oblicz L.

Odpowiedź: 6

Logarytm odczytuje wykładnik potęgi 2.

2. W modelu firma potraja sprzedaż co rok. Po ilu latach sprzedaż wzrośnie 3^4 razy?

Odpowiedź: 4

$3^t = 3^4$, więc $t = 4$.

3. Czujnik używa umownej skali $S = \log_{10} I$. Odczyt zmalał z 6 do 4. Ile razy zmalało I?

Odpowiedź: 100

Iloraz wartości to $10^6/10^4 = 10^2 = 100$.

4. Zadanie odwrócone: $\log_5 I = 4$. Odtwórz dodatnie I.

Odpowiedź: 625

Z definicji logarytmu $I = 5^4 = 625$.